Situations de soins

C S V R

NE JAMAIS PANIQUER MAIS CALMER ET RASSURER

FEUILLE D'INTERVENTION

Noter
la date et l'heure de
l'évènement

Noter
l'identité
de l'enfant blessé

Noter
la nature de la blessure

Noter l'identité
de l'adulte qui
a pris en charge

Se laver les mains
et/ou mettre des
gants (latex ou autres)

QUELQUES SITUATIONS

TRAUMATISME DES MEMBRES, ARTICULATIONS

- Glace ou eau froide

Si la blessure semble grave, rester immobile et appeler les parents et/ou le 144

CHUTE

- Pas de spectateur
- Ne pas le relever

Perte de connaissance, vomissement, pupilles dilatées = appeler les parents et/ou le 144

CRISE D'ANGOISSE (MALAISE VAGAL)

- Respirer calmement
- Isoler
- Rassurer

Angoisse persistante = appeler les parents

PLAIES

- Laver ses mains
- Laver la plaie (eau+savon)
- Rincer-sécher
- Désinfection du centre vers l'extérieur

Plaie profonde = appeler les parents et/ou le 144

HEMATOME

- Glace 20mn

Douleur persistante ou gonflement = appeler les parents

TRAUMATISME DE L'OEIL

- Rinçage abondant de l'œil

Corps étranger dedans ? NE JAMAIS ENLEVER SOI-MÊME appeler les parents et/ou le 144

BRÛLURES

- Sous eau froide/tiède 10mn à 20mn
- Ne jamais percer une ampoule !

Brûlure étendue et/ou du visage = appeler le 144 immédiatement!

SAIGNEMENT DE NEZ

- Appuyer sur la narine concernée minimum 10mn
- Faire moucher
- Tête en avant



Si saigne encore = appeler les parents

PIQÛRES D'INSECTES

- Allergie? = protocole
- Chauffer petite cuillère
- Tapoter sur piqûre



Piqûre dans la bouche ? = appeler les parents et/ou le 144

CHUTE DE DENT

- Rinçage de la bouche
- Retrouver morceaux cassés
- Rincer, faire garder dans la bouche si possible
- Sinon mettre dans le kit d'urgence

Appeler les parents

MAUX DE TÊTE, CÉPHALÉE PRIMAIRE

- Isoler l'enfant, endroit calme, pénombre
- Demander si raison explicable

Appeler les parents

CORPS INHALÉ

Si obstruction totale :
l'enfant ne parle pas, ne respire plus, ne tousse pas et devient violacé procéder à la manœuvre de Heimlich:

- Se placer derrière la victime
- Positionner un poing au niveau du nombril
- Recouvrir le poing avec l'autre main
- Remonter le poing d'un coup sec vers soi et vers le haut
- Recommencer la manœuvre si nécessaire

Si obstruction partielle : asseoir l'enfant, le rassurer et appeler les parents et/ou le 144

NBK / 20